

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

Część A – Programy lekowe

| Lp. | KOD | NUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZ | ROZPOZNANIE KLINICZNE ICD-10 | NAZWA PROGRAMU | SUBSTANCJE CZYNNE |
|-----|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 03.0000.301.02 | B.1. | B 18.1 | Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B | INTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B; LAMIWUDYNA; ENTEKAWIR; ADEFOWIR; TENOFOWIR |
| 2 | 03.0000.302.02 | B.2. | B 18.2 | Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C | INTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A; INTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2B; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B; RYBAWIRYNA; SYMEPREWIR |
| 3 | 03.0000.303.02 | B.3. | C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48 | Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) | IMATYNIB; SUNITYNIB, SORAFENIB |
| 4 | 03.0000.304.02 | B.4. | C 18 – C 20 | Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego | BEWACYZUMAB; CETUKSYMAB; PANITUMUMAB |
| 5 | 03.0000.305.02 | B.5. | C 22.0 | Leczenie raka wątrobowokomórkowego | SORAFENIB |
| 6 | 03.0000.306.02 | B.6. | C 34 | Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca | PEMETREKSED; GEFITYNIB; ERLOTYNIB; KRYZOTYNIB |
| 7 | 03.0000.308.02 | B.8. | C 48, C 49 | Leczenie mięsaków tkanek miękkich | TRABEKTEDYNA; PAZOPANIB, SUNITYNIB |
| 8 | 03.0000.309.02 | B.9. | C 50 | Leczenie raka piersi | TRASTUZUMAB; LAPATYNIB; PERTUZUMAB |
| 9 | 03.0000.310.02 | B.10. | C 64 | Leczenie raka nerki | SUNITYNIB; SORAFENIB; EWEROLIMUS; PAZOPANIB; AKSYTYNIB; TEMSYROLIMUS |

| | | | | | |
|----|----------------|-------|--|---|---|
| 10 | 03.0000.312.02 | B.12. | C 82, C 83 | Leczenie chłoniaków złośliwych | RYTUKSYMAB |
| 11 | 03.0000.314.02 | B.14. | C 92.1 | Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej | DASATYNIB; NILOTYNIB |
| 12 | 03.0000.315.02 | B.15. | D 66, D 67 | Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B | Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII; Koncentrat czynnika krzepnięcia IX |
| 13 | 03.0000.317.02 | B.17. | D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89 | Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci | IMMUNOGLOBULINY |
| 14 | 03.0000.318.02 | B.18. | E 22.8 | Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci | LEUPRORELINA; TRIPTORELINA |
| 15 | 03.0000.319.02 | B.19. | E 23 | Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki | SOMATOTROPINA |
| 16 | 03.0000.320.02 | B.20. | E 34.3 | Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 | MEKASERMINA |
| 17 | 03.0000.321.02 | B.21. | E 72.1 | Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii | BETAINA BEZWODNA |
| 18 | 03.0000.322.02 | B.22. | E 74.0 | Leczenie choroby Pompego | ALGLUKOZYDAZA ALFA |
| 19 | 03.0000.323.02 | B.23. | E 75.2 | Leczenie choroby Gaucher'a | IMIGLUCERAZA |
| 20 | 03.0000.324.02 | B.24. | E 76.0 | Leczenie choroby Hurler | LARONIDAZA |
| 21 | 03.0000.325.02 | B.25. | E 76.1 | Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) | IDURSULFAZA |
| 22 | 03.0000.326.02 | B.26. | E 76.2 | Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux – Lamy) | GALSULFAZA |

| | | | | | |
|----|----------------|-------|--|---|--|
| 23 | 03.0000.327.02 | B.27. | E 84 | Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą | TOBRAMYCYNA |
| 24 | 03.0000.328.02 | B.28. | G 24.3, G 24.5, G 24.4, G 51.3, G 24.8 | Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy | TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A |
| 25 | 03.0000.329.02 | B.29. | G 35 | Leczenie stwardnienia rozsianego | INTERFERON BETA; OCTAN GLATIRAMERU; FUMARAN DIMETYLU; PEGINTERFERON BETA-1A; ALEMTUZUMABUM; TERIFLUNOMIDUM |
| 26 | 03.0000.330.02 | B.30. | G 80 | Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym | TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A |
| 27 | 03.0000.331.02 | B.31. | I 27, I27.0 | Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) | ILOPROST; BOSENTAN; TREPROSTINIL; AMBRISENTAN; TADALAFIL |
| 28 | 03.0000.332.02 | B.32. | K 50 | Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) | INFLIKSYMAB; ADALIMUMAB |
| 29 | 03.0000.333.02 | B.33. | M 05, M 06, M 08 | Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym | INFLIKSYMAB; ETANERCEPT; ADALIMUMAB; RYTUKSYMAB; GOLIMUMAB; CERTOLIZUMAB PEGOL; TOCILIZUMAB |
| 30 | 03.0000.335.02 | B.35. | L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3 | Leczenie łuszczykowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) | INFLIKSYMAB; ETANERCEPT; ADALIMUMAB; GOLIMUMAB; CERTOLIZUMAB PEGOL |
| 31 | 03.0000.336.02 | B.36. | M 45 | Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zeszytniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) | INFLIKSYMAB; ETANERCEPT; ADALIMUMAB; GOLIMUMAB; CERTOLIZUMAB PEGOL |
| 32 | 03.0000.337.02 | B.37. | N 18 | Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek | EPOETYNA ALFA; DARBEPOETYNA ALFA; GLIKOL METOKSYPOLIETYLENOWY EPOETYNY BETA |
| 33 | 03.0000.338.02 | B.38. | N 18 | Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) | SOMATOTROPINA |
| 34 | 03.0000.339.02 | B.39. | N 25.8 | Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych | CYNAKALCET |
| 35 | 03.0000.340.02 | B.40. | P07.2, P 27.1 | Profilaktyka zakażeń wirusem RS | PALIWIZUMAB |
| 36 | 03.0000.341.02 | B.41. | Q 87.1 | Leczenie zespołu Prader - Willi | SOMATOTROPINA |

| | | | | | |
|----|----------------|-------|---|--|--|
| 37 | 03.0000.342.02 | B.42. | Q 96 | Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT) | SOMATOTROPINA |
| 38 | 03.0000.343.02 | B.43. | B 18, w tym: B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9; B 19 W CAŁOŚCI; C 82; C 83; Z 94 | Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem | LAMIWUDYNA |
| 39 | 03.0000.344.02 | B.44. | J 45.0 | Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem | OMALIZUMAB |
| 40 | 03.0000.346.02 | B.46. | G.35 | Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego | FINGOLIMOD, NATALIZUMAB |
| 41 | 03.0000.347.02 | B.47. | L40.0 | Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy płackowatej (ICD-10 L40.0) | USTEKINUMAB; ADALIMUMAB; ETANERCEPT; INFLIKSYMAB |
| 42 | 03.0000.348.02 | B.48. | C43 | Leczenie czerniaka skóry | WEMURAFENIB; KOBIMETYNIB |
| 43 | 03.0000.349.02 | B.49. | E83.1 | Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie | DEFERAZYROKS |
| 44 | 03.0000.350.02 | B.50. | C56; C57; C48 | Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika | BEWACYZUMAB |
| 45 | 03.0000.352.02 | B.52. | C01; C05.0; C05.1; C05.2; C05.8; C05.9; C09.0; C09.1; C09.8; C09.9; C10.0; C10.1; C10.2; C10.3; C10.4; C10.8; C10.9; C12; C13.0; C13.1; C13.2; C13.8; C13.9; C32.0; C32.1; C32.2; C32.3; C32.8; C32.9 | Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie | CETUKSYMAB |
| 46 | 03.0000.353.02 | B.53. | C25.4 | Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki | EWEROLIMUS; SUNITYNIB |
| 47 | 03.0000.354.02 | B.54. | C90.0 | Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego | LENALIDOMID |
| 48 | 03.0000.355.02 | B.55. | K51 | Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51) | INFLIKSYMAB |
| 49 | 03.0000.356.02 | B.56. | C61 | Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego | OCTAN ABIRATERONU |

| | | | | | |
|----|----------------|-------|--|--|--------------------------------------|
| 50 | 03.0000.357.02 | B.57. | I61, I63, I69 | Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A | TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A |
| 51 | 03.0000.358.02 | B.58. | C16 | Leczenie zaawansowanego raka żołądka | TRASTUZUMAB |
| 52 | 03.0000.359.02 | B.59. | C43 | Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43) | IPILIMUMAB; NIVOLUMAB; PEMBROLIZUMAB |
| 53 | 03.0000.360.02 | B.60. | E 75.2 | Leczenie choroby Gaucher'a typu I | WELAGLUCERAZA ALFA |
| 54 | 03.0000.361.02 | B.61. | E72.0 | Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej | CYSTEAMINA |
| 55 | 03.0000.362.02 | B.62. | D 80, w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9 | Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych | IMMUNOGLOBULINY |
| 56 | 03.0000.363.02 | B.63. | C 34 | Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu (ICD-10 C34) | AFATYNIB |
| 57 | 03.0000.364.02 | B.64. | R62.9 | Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) | SOMATOTROPINA |
| 58 | 03.0000.365.02 | B.65. | C91.0 | Leczenie dasatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) | DASATYNIB |
| 59 | 03.0000.366.02 | B.66. | C84.0, C84.1 | Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego | BEKSAROTEN |
| 60 | 03.0000.367.02 | B.67. | G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2 | Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych | IMMUNOGLOBULINY |
| 61 | 03.0000.368.02 | B.68. | I27, I27.0 | Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem | SILDENAFIL; EPOPROSTENOL; MACYTENTAN |
| 62 | 03.0000.369.02 | B.69. | N25.8 | Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych | PARYKALCYTOL |

| | | | | | |
|----|----------------|-------|--|--|---|
| 63 | 03.0000.370.02 | B.70. | H35.3 | Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) | AFLIBERCEPT; RANIBIZUMAB |
| 64 | 03.0000.371.02 | B.71. | B 18.2 | Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2) | OMBITASWIR, PARYTAPREWIR, RYTONAWIR; DASABUWIR; DAKLATASWIR; LEDIPASWIR, SOFOSBUWIR; SOFOSBUWIR; ELBASVIR + GRAZOPREXIR |
| 65 | 03.0000.372.02 | B.72. | C 43 | Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43) | DABRAFENIB; TRAMETYNIB |
| 66 | 03.0000.373.02 | B.73. | N31 | Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31) | TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A |
| 67 | 03.0000.374.02 | B.74. | I27, I27.0 i/lub I26 | Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26) | RIOCYGUAT |
| 68 | 03.0000.375.02 | B.75. | M 31.3, M 31.8 | Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) | RYTUKSYMAB |
| 69 | 03.0000.376.02 | B.76. | E70.2 | Leczenie tyrozyinemii typu 1 (HT-1) (ICD-10 E70.2) | NITYZYNON |
| 70 | 03.0000.377.02 | B.77. | C 81, C 84.5 | Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T) | BRENTUKSYMAB VEDOTIN |
| 71 | 03.0000.378.02 | B.78. | D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9 | Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10 D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9) z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką | IMMUNOGLOBULINY |
| 72 | 03.0000.379.02 | B.79. | C.91.1 | Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD-10 C91.1) | OBINUTUZUMAB |
| 73 | 03.0000.380.02 | B.80. | C56, C57, C48 | Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) | OLAPARYB |
| 74 | 03.0000.381.02 | B.81 | D47.1 | Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej | RUKSOLITYNIB |
| 75 | 03.0000.382.02 | B.82 | M 46.8 | Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK | CERTOLIZUMAB PEGOL |

| | | | | | |
|----|----------------|------|--|--|---------------------------|
| 76 | 03.0000.383.02 | B.83 | I61, I63, I69 | Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A | TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A |
| 77 | 03.0000.384.02 | B.84 | D46 | Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q | LENALIDOMID |
| 78 | 03.0000.385.02 | B.85 | C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9 | Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki | PAKLITAKSEL Z ALBUMINĄ |
| 79 | 03.0000.386.02 | B.86 | E85, R50.9, D89.8, D89.9 | Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych | ANAKINRA |
| 80 | 03.0000.387.02 | B.87 | J84.1 | Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc | PIRFENIDON |
| 81 | 03.0000.388.02 | B.88 | C44 | Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem | WISMODEGIB |
| 82 | 03.0000.389.02 | B.89 | Q85.1 | Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowe z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwysięłkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) | EWEROLIMUS |
| 83 | 03.0000.390.02 | B.90 | G.20 | Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona | LEVODOPUM + CARBIDOPUM |

Część B – Kwalifikacje do programów lekowych

| Lp. | KOD | NUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZ | ROZPOZNANIE KLINICZNE ICD-10 | NAZWA PROGRAMU |
|-----|----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 03.0000.201.02 | B.19., B.20., B.38., B.41., B.42., B.64. | E 23, E 34.3, N 18, Q 87.1, Q 96, R62.9 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia hormonem wzrostu oraz insulinopodobnym czynnikiem wzrostu– 1 |
| 2 | 03.0000.202.02 | B.33., B.35., B.36., B.82 | M 05, M 06, M 08, M 45, L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3, M 46.8 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych |
| 3 | 03.0000.203.02 | B.21., B. 22., B.23., B.24., B.25., B.26., B.60., B.61., B.76., B.86 | E 72.1, E 74.0, E 76.0, E 76.1, E 76.2, E75.2, E72.0, E70.2, E85, R50.9, D89.8, D89.9 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia chorób ultrazadkowych |
| 4 | 03.0000.204.02 | B.15. | D 66, D 67 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B |
| 5 | 03.0000.205.02 | B.44. | J 45.0 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej astmy alergicznego IgE zależnej |
| 6 | 03.0000.206.02 | B.47. | L40.0 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej |
| 7 | 03.0000.207.02 | B.49. | E83.1 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie |
| 8 | 03.0000.208.02 | B.62., B.78 | D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9 | Kwalifikacja i weryfikacja leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych |
| 9 | 03.0000.209.02 | B.70. | H 35.3 | Kwalifikacja do leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) |
| 10 | 03.0000.210.02 | B.75. | M 31.3, M 31.8 | Kwalifikacja do leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) |
| 11. | 03.0000.211.02 | B.88 | C44 | Kwalifikacja do leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem |

| | | | | |
|-----|----------------|------|------|--|
| 12. | 03.0000.212.02 | B.90 | G.20 | Kwalifikacja do leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona |
|-----|----------------|------|------|--|