

Uzupełnienie informacji do schematu dla dyspozytora PRM

Kontakt (narażenie) z osobą chorą na EVD:

1. *Narażenie wysokiego ryzyka obejmuje:*

- przezskórne (np. ukłucie igłą) lub poprzez błony śluzowe narażenie na płyny ustrojowe pacjenta chorego na EVD,
- bezpośrednią opiekę lub ekspozycję na płyny ustrojowe pacjenta chorego na EVD, bez odpowiedniej ochrony osobistej (*ang. personal protective equipment – PPE*),
- personel laboratoryjny pracujący z płynami ustrojowymi pacjenta chorego na EVD bez odpowiedniej ochrony osobistej (PPE) lub bez przestrzegania odpowiednich wymogów bezpieczeństwa biologicznego,
- uczestniczenie w obrzędach pogrzebowych obejmujących bezpośredni kontakt ze zwłokami ludzkimi na obszarze, gdzie występują zachorowania na EVD, bez odpowiedniej ochrony osobistej (PPE).

2. *Narażenia niskiego ryzyka obejmuje:*

- przebywanie w gospodarstwie domowym lub inny przypadkowy kontakt¹ z pacjentem chorym na EVD,
- opiekę nad pacjentem lub inny przypadkowy kontakt nie obejmujący narażenia wysokiego ryzyka, z pacjentem chorym na EVD w placówce ochrony zdrowia w krajach, gdzie stwierdzono zachorowania na EVD.

3. *Narażenie o nieustalonym ryzyku obejmuje:*

- każdą osobę przebywającą w ciągu ostatnich 21 dni w kraju, w którym stwierdzono zachorowania na EVD, u której nie stwierdzono zarówno narażenia o niskim ani wysokim ryzyku.

¹ Przypadkowy kontakt jest definiowany jako:

- a) przebywanie w odległości średnio 1 metra lub w jednym pomieszczeniu lub w placówce opieki zdrowotnej przez dłuższy czas (np. personel medyczny, członkowie rodziny) bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) lub
- b) znalezienie się przez krótki czas w bliskim kontakcie (np. przez uścisk ręki) z osobą zakażoną EVD bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE).

Definicja przypadkowego kontaktu nie obejmuje: krótkich kontaktów takich jak przechodzenie obok pacjenta chorego na EVD lub poruszanie się po szpitalu.